

OBAVIJEST ZA BOLESNIKE O OPERACIJAMA KRONIČNE UPALE UHA

Miringoplastika / timpanoplastika je zahvat koji se izvodi kod kroničnih upale srednjeg uha kad postoji rupica ili potpuni nedostatak bubnjića. Ponekad su upalom oštećene i slušne koščiće, u uhu postoji upalni sadržaj (gnoj, kolesteatom, granulacije). U većine bolesnika zahvat prođe bez ikakvih komplikacija, uz blagu do umjerenu bol i planirani otpust iz bolnice u roku od par dana. Nakon zahvata zaostane manji ožiljak na mjestu reza kože, iza uške ili pored ulaza u zvukovod.

Operacija se izvodi u općoj anesteziji, započinje rezom kože iza uha. Glavni cilj operacije je uklanjanje upale, a kad god je moguće nastoji se istovremeno popraviti oštećenja bubnjića i slušnih košćica. Ponekad je na žalost potrebno odstraniti dio bubnjića ili slušnih košćica. Nakon odstranjenja (brušenjem) oboljele kosti i uklanjanjem bolesne sluznice operacija se završava šivanjem reza kože iza uha.

Uz uobičajenu preoperativnu obradu većine bolesnika zahvat prođe bez ozbiljnih nuspojava i komplikacija, međutim moguće su komplikacije: Postoperativno krvarenje je komplikacija koja se većinom pojavljuje u prvih 24 sata nakon operacije i rijetko zahtijeva reviziju operativnog polja. Moguće komplikacije su infekcija rane. Upala uha s curenjem iz uha može se ponovo pojaviti u bilo koje vrijeme nakon kirurškog zahvata i nakon što se u potpunosti odstrani upala iz uha.

Iako je cilj timpanoplastike popraviti to oštećenje, prilikom odstranjivanja upale ponekad je tijekom zahvata potrebno odstraniti i dio bubnjića ili slušnih košćica. Jedan od mogućih uzroka je i nastanak upale u prvim tjednima nakon operacije. Jedan od ciljeva operacije je poboljšanje sluha, međutim moguće je i pogoršanje sluha nakon operacije ukoliko je upala zahvatila pojedine osjetljive dijelove uha koje je pri operaciji potrebno odstraniti.

Smetnje ravnoteže i vrtoglavice mogu se pojaviti ako se upala proširila blizu unutarnjeg uha. Smetnje su pri tom izraženije u prvim danima ili satima nakon operacije, mogu se smiriti primjenom lijekova.

Kljenuć živca može nastati ukoliko se upala proširila blizu koštanog kanala kojim prolazi lični živac. U tijeku odstranjivanja takve kosti može doći do privremenog, a izuzetno rijetko i trajnog oštećenja ličnog živca. Prilikom kirurških zahvata u srednjem uhu može se ozlijediti korda timpani, pri čemu mogu nastupiti smetnje okusa. Ozljeda temporomandibularnog zgloba može nastati pri bilo kojoj operaciji u uhu, jer se navedeni zglob nalazi neposredno ispred zvukovoda.

Oštećenje moždanih ovojnica nastaje ako se upala proširila do moždanih ovojnica, a bolesno tkivo u njenoj neposrednoj blizini potrebno je odstraniti. Takva oštećenja najčešće spontano zarastu, a veća oštećenja moguće je kirurški zatvoriti. Glavobolja može nastati zbog kronične upale, zbog kirurškog zahvata, ali i drugih razloga koji ne moraju biti povezani s upalom ili kirurškim zahvatom.

Potvrđujem da sam upoznat(a) s prirodom svoje bolesti, osnovnim načinima liječenja, razlogom za kirurško liječenje i s rizicima operacije, kao i s rizicima koje nosi bolest ako se ne liječi. Pojava komplikacije može zahtijevati prošireni ili novi operacijski zahvat, s čime sam također upoznat(a). Pristajem na to da se materijali dobiveni tijekom mog liječenja koriste u znanstvene, stručne i edukativne svrhe, uz zaštitu mog identiteta.

Posebne napomene bolesnika ili liječnika vezane za operacijski zahvat (npr. nepristajanje na transfuziju, proširenje zahvata i sl.):
