

## OBAVIJEST ZA BOLESNIKE O OPERACIJAMA KRONIČNE UPALE UHA

Srednje uho se sastoji od bubnjića, slušnih koščica i mastoidnih stanica koje se nalaze u kosti iza uha, a povezane su s šupljinom srednjeg uha. Akutne i kronične upale srednjeg uha lako se mogu zahvatiti sve opisane strukture i proširiti se na okolne kosti zbog čega je neophodno učiniti operaciju koja se zove **timpanomastoidektomija**.

Operacija se izvodi u općoj anesteziji, započinje rezom kože iza uha. Glavni cilj operacije je uklanjanje upale, a kad god je moguće nastoji se istovremeno popraviti oštećenja bubnjića i slušnih koščica. Ponekad je na žalost potrebno odstraniti dio bubnjića ili slušnih koščica. Nakon odstranjenja (brušenjem) oboljele kosti i uklanjanjem bolesne sluznice operacija se završava šivanjem reza kože iza uha.

Uz dobru preoperativnu obradu većine bolesnika zahvat prođe bez ozbiljnih nuspojava i komplikacija, iako je poznato da niti jedan zahvat nije bez rizika.

**Opći rizici** bilo koje vrste operacija jesu: krvarenje, tromboza, odnosno embolija, infekcija rana, bolnost, alergijska reakcija na sredstvo ili lijek primijenjen u tijeku operacije, što može rezultirati i anafilaktičkim šokom i njegovim mogućim posljedicama (u vrlo rijetkim slučajevima teškim posljedicama, uključujući i smrt).

### **Specifični rizici:**

- Nakon operacije se može javiti povremena glavobolja.
- Na operativnom rezu ponekad se može javiti povećan ožiljak ili keloid. Ponekad može doći do ožiljnog sužavanja zvukovoda. Rijetko se javlja upale hrskavice ušne školjke.
- Upala uha s curenjem iz uha može se pojaviti u bilo koje vrijeme nakon kirurškog zahvata i nakon što se u potpunosti odstrani upala iz uha.
- Oštećenje sluha i šum rijetke su komplikacije. Osim odstranjivanja upale najčešći je cilj operacija uha poboljšanje sluha, međutim posljedica zahvata mogu biti smetnje i smanjenje sluha nakon operacije. Rijetko se mogu javiti smetnje ravnoteže i mučnine s povraćanjem.
- U tijeku operacije može doći do privremene ili trajne kljenuti ličnog živca, što za posljedicu ima lošiji rad mišića lica koje on podražuje ili smetnje okusa.
- Izuzetno rijetko se mogu javiti upale moždanih ovojnica, a nastaje kod opsežnih upala uha koje zahvaćaju okolnu kost koja graniči s lubanjskom jamom i širenjem upale na moždane ovojnice.
- Upala se može proširiti i na venske sinuse koji leže u blizini srednjeg uha što može izazvati njihovu trombozu i/ili sepsu.

Potvrđujem da sam upoznat(a) s prirodom svoje bolesti, osnovnim načinima liječenja i razlogom za kirurško liječenje.

Potvrđujem da sam upoznat(a) s rizicima operacije, ali i s rizicima koje nosi bolest ako se ne liječi.

Pojava komplikacije može zahtijevati novi, prošireni operacijski zahvat, s čime sam također upoznat(a).

Pristajem na to da se materijali dobiveni u tijeku mog liječenja (npr. tkivo, fotografije, video) koriste u znanstvene, stručne i edukativne svrhe, uz zaštitu mog identiteta.

Posebne napomene bolesnika ili liječnika vezane za operacijski zahvat (npr. nepristajanje na transfuziju, proširenje zahvata i sl.):

---

---

---